



노랑나비 / *Colias erate* (Esper, 1805)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	노랑나비속
과국명	흰나비과

과명	Pieridae
일반특징	<p>보통 날개가 노란색이며 앞날개 중심에는 뚜렷한 검은색 점무늬가 있다. 날개 끝부분에는 검은색의 테두리가 뚜렷하다. 수컷은 날개 윗면이 노란색이지만, 암컷의 경우는 노란색과 흰색으로 구분된다. 유전적으로는 흰색이 우성인 것으로 알려져 있다. 나비의 날개색이 다를 때에는 큰 문제가 없지만, 날개가 노란색인 경우 암수 구별이 다소 곤란하므로 배끝을 조사해야 알 수 있다. 주로 마을이나 풀과 나무, 또는 해변가의 탁 트인 초지에 서식하며 우리나라 전국 어디에서든 흔하게 관찰된다. 1년에 3~4번, 3월말에서 10월에 걸쳐 나타난다. 암수 모두 개망초, 토끼풀, 엉겅퀴 등의 꽃에서 꿀을 먹는다. 암컷은 오후 늦게 먹이 식물의 어린 잎 표면에 날개로 알을 낳는다. 번데기의 형태로 겨울을 난다.</p>