



녹슬은비단그물버섯 / *Suillus viscidus* (L.) Fr.

구분	설명
생물분류	버섯
속국명	비단그물버섯속
과국명	비단그물버섯과

과명	Suillaceae
일반특징	<p>버섯의 자실체는 크게 갓, 주름, 대로 나누어진다. 녹슬은비단그물버섯의 갓은 반원 모양에서 편평해진다. 그 조직은 상처가 나면 청색 또는 황녹색으로 변한다.</p> <p>주름살 대신 관 모양의 구멍으로 되어 있는 것은 완전불은 모양에 약간 내린모습이다. 흰색 또는 회백색에서 갈색이 된다. 구멍은 크고 다각형이며, 상처가 나면 청색 또는 황녹색으로 변한다.</p> <p>대의 꼭대기는 유연한 막과 같은 상태며 오백색 또는 갈색의 턱받이가 있다가 없어진다. 턱받이의 위는 그물눈이 있다. 턱받이 아래에서 다소 가늘고 긴 모양의 끈적기가 있다.</p> <p>홀로 또는 무리지어 발생하며 가끔 둥글게 줄지어 바퀴 모양으로 돌아난다.</p> <p>분포지역 : 전국</p> <p>발생계절 : 여름~가을</p>