

 어린이 생물도감

: 2026 5 28 3:15



HERBARIUM	
Dept. of Botany, Seoul National University	
Family, <i>Salicaceae</i> <i>버드나뭇목</i>	No. 07827
Sci. Name <i>Salix pseudo-laciniifera</i> Levl.	
Kor. Name <i>눈꽃버들</i>	
Locality <i>충청북도 괴산군</i>	✓
Date <i>95, 11.20</i>	Coll. <i>이정호</i>
Habit.	Det. <i>3070072</i>

눈꽃버들 / *Salix graciliglans* Nakai

구분	설명
생물분류	식물
속국명	버드나무속
과국명	버드나무과
과명	Salicaceae
일반특징	<p>요약설명 : 버드나무과 낙엽 활엽 관목으로 전국 각지에서 자란다. 분포지역 : 전국 각처에 분포한다. 형태 : 낙엽활엽관목. 크기 : 높이가 1m정도 된다. 꽃색 : 검정색 개화기 : 3월,4월</p> <p>잎은 좁은 창 모양으로 침두이고 밑부분이 뾰족하다. 겉면에는 털이 없고 뒷면은 처음에 부드러운 털이 있으나 점차 없어지며 가장자리에 작은 톱니가 있다. 잎자루에는 털이 있을 때도 없을 때도 있다.</p> <p>꽃은 3~4월에 잎보다 먼저 잎이 달리는 자리에 핀다. 또한 암꽃과 수꽃은 각각 다른 그루에 달린다. 꽃을 감싸는 작은 잎은 긴 타원 모양 또는 달걀 같은 긴 타원모양이며 예두 또는 둔두이다. 또한 윗부분이 검은색이며 털이 있다. 수술은 2개, 꿀샘은 1개이며 수술대는 완전히 붙어 있다. 암꽃 꽃차례는 꽃대축에 털이 있다. 꽃을 감싸는 작은 잎은 달걀모양 침두로서 윗부분이 검은색이며 털이 있다. 씨방은 달걀모양이고 털이 나 있다. 암술대는 길고 암술머리는 4개, 꿀샘은 1개이다.</p> <p>열매는 삭과고 길고 부드러운 털이 있으며 4~5월에 익는다. 원줄기는 가지가 많이 갈라지고 땅 가까이에 누워 자란다. 어린 가지에는 부드러운 털이 있으나 점점 없어지고 노란빛을 띠는 초록색으로 변한다.. 들이나 냇가에서 흔히 자라며, 꺾꽂이로 번식시킨다.</p>