

 어린이 생물도감

: 2026 4 3 4:14



늦고사리삼 / *Botrychium virginianum* (L.) Sw.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	고사리삼속
과국명	고사리삼과
과명	Ophioglossaceae
일반특징	<p>요약설명 : 고사리삼과 여러해살이풀로 우리나라 전 지역에서 자란다. 일본에서도 볼 수 있다.</p> <p>분포지역 : 일본 / 한국(전역)</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 높이 30-70cm</p> <p>꽃색 : 자주색, 검정색, 녹색</p> <p>개화기 : 7월, 8월, 9월</p> <p>광합성을 왕성하게 하는 잎은 잎자루가 없고 3~4회 깃털모양으로 갈라져 전체가 삼출겹잎과 비슷하다. 또한 오각형 같은 삼각형이고 윤기가 도는 초록색이다. 양쪽 밑에 있는 깃털 모양 조각은 넓은 달걀모양이고 크기 때문에 가운데 있는 것과 더불어 삼출겹잎과 비슷하게 보인다. 잔깃조각은 긴 타원모양이고 끝이 뾰족하다. 또한 깊게 갈라지거나 깊은 톱니가 있다. 흄씨주머니 이삭은 여름철에 첫째 깃털 모양 조각이 갈라진 곳에서 곧게 자라면서 윗부분이 3~4회 갈라진다. 또한 각 가지에 좁쌀 같은 흄씨주머니가 달린다.</p> <p>줄기의 높이는 30~70cm이고 15~30cm의 높이에서 광합성을 하는 잎과 생식세포를 만드는 잎이 갈라진다.</p> <p>적당히 햇볕이 잘 드는 숲 속에서 자란다.</p>