



: 2026 1 26 4:59



단풍취 / *Ainsliaea acerifolia* Sch.Bip.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	단풍취속
과국명	국화과

과명	Compositae
일반특징	<p>요약설명 : 국화과 여려해살이풀로 전국 산지에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 전국 산지에 분포한다.</p> <p>형태 : 여려해살이풀이다.</p> <p>크기 : 높이 35~80cm이다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 8월, 7월, 9월</p> <p>잎은 원줄기 가운데에 4~7개가 돌려나는 것처럼 달리고 둥근 모양이다. 끝이 7~11개로 얇게 갈라진 다음 다시금 3개로 갈라지는 것이 있다. 양면과 잎자루에 털이 조금 있다.</p> <p>7~9월에 꽃이 하얀색으로 피고, 원줄기 끝에 이삭모양으로 달린다. 총포는 통모양이며 붉은빛을 띤다. 총포조각은 많고 여러 줄로 배열되며 그 속에 3개의 통모양 꽃이 들어 있다. 꽃잎은 하얀색이다.</p> <p>수과는 넓은 타원형이다. 양 끝이 좁으며 자주색 바탕에 좁은 선이 있다.</p> <p>열매의 위쪽 끝부분에 나온 털 뭉치는 갈색 또는 자줏빛이 도는 갈색이다.</p> <p>줄기의 높이는 35~80cm이고 가지가 없으며 곧게 서고, 긴 갈색 털이 드문드문 나 있다.</p> <p>산과 들에서 흔히 자란다.</p>