



당키버들 / *Salix purpurea* var. *smithiana* Trautv.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	버드나무속
과국명	버드나무과
과명	Salicaceae
일반특징	<p>요약설명 : 버드나무과 낙엽 활엽 관목으로 중부 지방을 기준으로 한 북쪽 지역에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 중부 이북에서 자란다.</p> <p>형태 : 낙엽활엽관목</p> <p>크기 : 높이 1-3m</p> <p>꽃색 : 자주색, 녹색</p> <p>개화기 : 4월</p> <p>잎은 어긋나기하거나 간혹 마주나기하고 선 같은 거꿀피침모양이며 위로부터 2/3가 가장 넓다. 끝이 짧게 뾰족하거나 점점두며 밑부분이 뾰족하다. 털이 없으며 겉면은 녹색, 뒷면은 흰빛이 돈다. 윗부분에 작은 톱니가 있으나 아랫부분은 밋밋하다. 잎자루와 작은 잎은 좁은 창 모양이고 표면은 오그라져서 겨울눈을 싸고 있다. 때로는 전혀 잎자루가 없이 잎 부분으로 가지를 싸고 있는 것처럼 보이는 것도 있다.</p> <p>꽃은 4월에 잎보다 먼저 전년에 돌아난 가지에 돌아나고, 꼬리모양꽃차례로 달린다. 수꽃의 포(꽃이나 싹을 보호하는 작은 잎과 같은 구조)는 거꿀달걀모양 원두이다. 연한 자주색 또는 연한 녹색이지만 끝에 검은 빛이 돌며 긴 털이 약간 있다. 꿀샘과 수술은 각각 1개이다. 수술은 포보다 2배 정도 길고 밑부분에 잔털이 있으며 꽃가루주머니는 홍자색이다. 암꽃은 꽃대축에 털이 있으며 포는 거꿀달걀모양 원두이다. 털이 있으며 연한 자주색이지만 끝은 흑색이고 꿀샘은 1개이다. 씨방은 대가 거의 없으며 긴 달걀모양이고 짧은 잔털이 뽀뽀히 자란다. 암술대는 없고 암술머리는 2개이다.</p> <p>열매는 삭과로서 털이 있으며 5월에 맺힌다.</p> <p>줄기는 높이가 1~3m이고 가지가 많다. 어린 가지는 녹색 또는 붉은색이 돌며 털이 없다. 겨울눈도 달걀 같은 타원 모양이며 털이 없다.</p> <p>하천가나 산골짜기의 습지에 잘 자란다. 씨앗을 뿌리거나 꺾꽂이를 하여 번식하며, 능수버들과 번식하는 방법이 비슷하다.</p>