



대륙사슴 / *Cervus nippon*

구분	설명
생물분류	야생동물

속국명	사슴속
과국명	사슴과
과명	Cervidae
일반특징	<p>크기는 노루보다 크며 북한의 백두산사슴보다는 훨씬 작다. 엉덩이의 흰 반점이 백두산사슴과 구별되며, 몸의 반점은 여름보다 겨울에 더 많이 보인다. 여름과 겨울에 몸 색깔의 차이를 보이는데, 여름에는 어두운 회갈색을 보이고, 겨울에는 밝은 갈색을 띤다. 수컷은 암컷보다 1.5배 정도 크다.</p> <p>일제강점기까지만 해도 대륙사슴은 제주도를 포함한 전국에서 살고 있었지만, 조선총독부에서 야생동물을 마구잡이로 사냥하기 위하여 진행된 사업인 해수구제사업으로 멸종되어 자취를 감추었다. 사람의 자취가 드문 산에서 무리를 지어 생활하며, 울창한 밀림과 바위산에서는 볼 수 없다. 계절에 따라 사는 장소가 다른데, 겨울에는 눈이 약간 덮여있고 햇볕이 잘 드는 곳, 봄과 가을에는 나무가 드문 초원, 여름에는 나무 그늘이 많고 산과 물이 많은 초원에서 산다. 먹이는 주로 풀, 나뭇잎, 연한 싹, 나무껍질, 도토리, 이끼, 버섯류이다. 새끼는 4~6월에 보통 한 마리, 드물게 두 마리의 새끼를 낳는다.</p>