



대만흰나비 / *Pieris canidia* (Linnaeus, 1768)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	흰나비속
과국명	흰나비과

과명	Pieridae
일반특징	<p>날개의 바탕색은 흰색이다. 앞날개 끝부분에는 검은색 테두리가 선명하게 발달되어 있으며 안쪽으로 파여 있는데, 이것이 배추흰나비와의 차이점이다. 암컷이 수컷보다 뒷면의 검은 무늬가 넓고, 앞날개에 검은색 비늘가루가 퍼져있다. 일반적으로 봄형이 여름형보다 작고 검은 무늬의 발달이 약하다. 농사를 짓는 땅이나 산림의 경계를 이루는 곳, 개울가에서 볼 수 있다. 보통 여리게 날아다니는데 특히 바람이 없을 때는 비탈진 곳을 미끄러져 내려오듯이 난다. 봄형은 4월~5월, 여름형은 5월 말~10월에 걸쳐 1년에 세 번 나타난다. 수컷의 경우 나비길을 약하게 형성하며, 온도가 높을 때나 오전에는 물가에서 물을 먹는다. 암수 모두 냉이, 개망초, 엉겅퀴, 조이풀 등의 꽃을 찾아 꿀을 먹는 것이 종종 관찰된다. 암컷은 먹이 식물의 잎 표면에 한 개씩 알을 낳는다. 번데기로 겨울을 난다.</p>