



두메고들빼기 / *Lactuca triangulata* Maxim.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	왕고들빼기속
과국명	국화과

과명	Compositae
일반특징	<p>요약설명 : 국화과 두해살이풀로 전국의 깊은 산 지역에서 자란다. 중국과 일본, 러시아에서도 볼 수 있다.</p> <p>분포지역 : 한국, 중국, 일본, 러시아에 분포한다.전국의 심산지역에서 자란다.</p> <p>형태 : 두해살이풀</p> <p>크기 : 높이 1m.</p> <p>꽃색 : 노란색</p> <p>개화기 : 7월,8월</p> <p>밑부분의 잎은 일찍 떨어진다. 잎은 어긋나며 세모 모양 또는 세모난 심장모양이고 예두이다. 가장자리가 불규칙하게 치아 모양으로 갈라지며 밑부분이 얇은 심장저 또는 절저이다. 겉면은 초록색이고 뒷면은 하얀빛을 띠며 일부분이 둥근 심장 모양으로 되어 원줄기를 감싼다. 잎자루에 날개가 있다. 위로 올라갈수록 잎이 작아지고 잎자루가 원줄기를 감싸지 않는다.</p> <p>꽃은 7-8월에 노란색으로 피고 원줄기 끝에 큰 원뿔모양꽃차례가 발달하여 많은 머리모양꽃차례가 달린다. 머리모양꽃차례는 15개 정도의 혀꽃으로 구성된다. 총포는 통처럼 생긴 종 모양이다. 총포조각은 2~3층으로 배열된다. 또한 뒷면에 털과 분비샘이 발달한 짧은 털이 약간 있으며 끝이 뾰족하다. 바깥 조각은 달걀 같은 창 모양이며 안쪽 조각은 선 같은 창 모양이다.</p> <p>열매는 수과고 타원 모양 또는 넓은 달걀 모양이다. 납작하고 검은색 또는 어두운 붉은색을 띤다. 열매의 위쪽 끝부분에 붉은 털 뭉치는 하얀색이다.</p> <p>열매는 8~9월에 익는다.</p> <p>줄기는 높이가 1m에 달하고 곧게 선다. 둥글고 털이 없으며 밑부분이 자줏빛을 띠고 윗부분에서 가지가 갈라진다.</p> <p>깊은 산 지역에서 자란다.</p>