

 어린이 생물도감

: 2026 5 27 2:34



2012년도 식물·균류
표본정보DB 구축사업

| | |
|--|--------------------------------------|
| Kangwon National Univ. Herbarium (KWNUN) 068177 | |
| Fam. Name | : Aspidiaceae 및아과 |
| Sci. Name | : <i>Woodsia ilvensis</i> (L.) R.Br. |
| Kor. Name | : 두메우드풀 |
| Locality | : 강원도 양구군 (양구읍) |
| Coll. date | : 2008. 7. 10 |
| Collector | : 유키역 |
| Remarks | : |

두메우드풀 / *Woodsia ilvensis* (L.) R.Br.

| 구분 | 설명 |
|------|--|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 우드풀속 |
| 과국명 | 면마과 |
| 과명 | Dryopteridaceae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 면마과 여러해살이풀로 경기도의 관악산, 강원도 및 북부 지방에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 경기도의 관악산, 강원도 및 북부지방에서 자란다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 높이 5-10m, 지름 30cm 로 자란다.</p> <p>꽃색 : 갈색, 노란색</p> <p>개화기 : 4월, 5월</p> <p>잎자루는 적갈색이고 윤기가 있다. 밑에서부터 1/3~1/4부분에 관절이 있고 털과 비늘조각이 드문드문 있으며 밑부분의 비늘조각 가장자리에 털이 있다. 잎몸은 창 모양 또는 긴 타원 모양이다. 끝이 뾰족해지다가 뾰족하게 되고 밑부분부터 좁아지기도 한다. 2회 깃털 모양으로 갈라지고 겉면에 털이 있으며 뒷면에는 털과 비늘조각이 있다. 깃털 모양 조각은 5~15쌍이 있고 세모난 좁은달걀모양이며 대가 없다. 잔깃조각은 긴 타원 모양 또는 넓은 타원 모양이다. 끝이 뾰족하고 밑부분이 흐르며 가장자리에 톱니가 있거나 밧밧하다.</p> <p>흩씨주머니 무리는 진한 갈색이고, 이것을 덮고 있는 막은 불규칙하게 5~6개로 갈라지며, 갈라진 조각의 가장자리가 다시금 갈라진다.</p> <p>뿌리줄기는 짧고 비늘 조각이 촘촘하게 나 있으며 잎이 모여난다.</p> <p>바위 곁에서 자란다.</p> |