



멧노랑나비 / *Gonepteryx maxima* Butler, 1885

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	멧노랑나비속
과국명	흰나비과

과명	Pieridae
일반특징	<p>수컷은 날개 윗면이 짙은 노란색이고 날개 끝이 뾰족하지만, 암컷은 푸른색이 도는 흰색으로 수컷보다 다소 색이 옅다.</p> <p>산지의 풀이 많은 곳이나 잡목림 숲 주변의 햇볕이 잘 드는 곳에 서식한다. 6월 말~7월 초에 여름잠을 자고 8월 말~9월에 걸쳐 활동하다가 이듬해 5월 다시 활동을 시작하는 특성을 보이며 1년에 한 번 볼 수 있다. 암수 모두 둥근쥐손이풀, 엉겅퀴, 개망초 등의 꽃에서 꿀을 먹고, 수컷들은 떼지어 습지에서 물을 먹기도 한다. 암컷은 5월 중순에서 6월사이에 먹이 식물의 잎 표면, 줄기 등에 날개로 알을 낳는다. 한여름에는 여름잠을 자고 8월 중순 이후 다시 나타나 활동하는 것이 관찰된다. 겨울을 난 후 이듬해에도 날개의 파손 정도가 적다. 성충의 모습으로 겨울을 난다.</p>