



미역줄나무 / *Tripterygium regelii* Sprague & Takeda

구분	설명
생물분류	식물
속국명	미역줄나무속
과국명	노박덩굴과

과명	Celastraceae
일반특징	<p>요약설명 : 노박덩굴과 낙엽 활엽 덩굴성으로 미얀마, 중국, 대만, 일본과 우리나라에서는 황해도를 제외한 전국에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 미얀마, 중국, 대만, 일본; 황해도를 제외한 전국.</p> <p>형태 : 낙엽 활엽 덩굴성.</p> <p>크기 : 길이 2m.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 6월, 7월</p> <p>잎은 어긋나기하며 달걀형이고 밝은 녹색이다. 잎 뒷면 맥 위에 털이 있고 가장자리에는 둔한 톱니가 있다. 잎자루는 붉은갈색이며 마르면 잎과 함께 검은색이 된다.</p> <p>6~7월에 가지 끝이나 잎겨드랑이에서 흰색 꽃이 원뿔모양꽃차례로 핀다.</p> <p>9~10월에 둥근 열매가 익는다. 열매는 끝이 오목하며 연한 녹색이지만 붉은 빛이 돈다. 바람을 타고 멀리 날아 흩어지는 시과로 날개가 3개 있다.</p> <p>지리산에서는 천왕봉과 중봉사이의 해발 1,800-1,900m 지역까지 자라며 높은 산의 중복부 이상에 많이 분포한다.</p>