



바늘골 / *Eleocharis congesta* D.Don

| 구분 | 설명 |
|------|------|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 바늘골속 |
| 과국명 | 사초과 |

| | |
|------|---|
| 과명 | Cyperaceae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 사초과 한해살이풀로 제주도를 포함한 전국 각처에 분포한다. 분포지역 : 제주도를 포함 전국 각처에 분포한다. 형태 : 한해살이풀 크기 : 꽃대는 높이 5~40cm, 지름 0.2~1.0mm이다. 꽃색 : 녹색 개화기 : 10월,9월,8월,7월,6월 잎 대신 잎집만 있다. 잎집은 얇고 유연한 반투명의 막질 상태로 밑부분에 붉은 빛이 돈다. 6~10월에 이삭모양의 녹색 꽃이 핀다. 꽃대는 밝은 녹색이며 능선이 있다. 작은이삭은 좁은 달걀모양으로 밑부분에 싹이 달리기도 한다. 열매는 나무처럼 딱딱한 껍질속에 씨앗이 있는 수과로 거꿀달걀모양이고 연두색이며 밋밋한 편이다. 실처럼 가는 줄기가 모여 나며 뿌리줄기가 없다. 습지나 물가, 논두렁에서 흔하게 자란다.</p> |