



: 2026 1 17 1:51



0003967



Flora of Korea  
Cyperaceae  
*Carex phacote* Spreng.  
버늘사초  
Mt. Sam-ak, Chun-cheon-si, Gang-won-do  
등산로  
Collector: Hyeong-gon Lee, Jin-seon Kim, Hui-yeong  
Kim, Seon-suk Yoon  
Coll. Date: 29 Apr. 1995  
Herbarium of Hallym University (HCU)

바늘사초 / *Carex onoei* Franch. & Sav.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	사초속
과국명	사초과
과명	Cyperaceae
일반특징	<p>요약설명 : 사초과 여러해살이풀로 전국에 걸쳐 분포한다.</p> <p>분포지역 : 전국에 걸쳐 분포한다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀이다.</p> <p>크기 : 높이 15~30cm이다.</p> <p>꽃색 : 녹색</p> <p>개화기 : 7월, 6월</p> <p>잎은 실같이 가늘고 편평하며 밑부분의 잎집은 갈색이다.</p> <p>6~7월에 꽃이 핀다. 작은이삭은 연한 녹색이며 줄기 끝에 1개씩 달린다.</p> <p>윗부분에는 수꽃이 그 밑에는 암꽃이 달린다.</p> <p>열매는 나무처럼 딱딱한 껍질 속에 씨앗이 있는 수과로 세모진 달걀모양이다.</p> <p>짧은 뿌리줄기에서 줄기가 모여나기한다. 줄기는 부드러우나 윗부분은 꼿꼿하다.</p> <p>산지의 숲 속 응달에서 무리지어 자라며 애기바늘사초에 비하여 잎이 넓고 가는 맥이 있다.</p>