



: 2026 1 18 7:16

---



밤색우단풍뎅이 / *Maladera castanea* (Arrow)

---

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	애우단풍뎅이속
과국명	검정풍뎅이과
과명	Melolonthidae
일반특징	<p>몸길이는 8~10 mm이며 몸은 긴 계란형이다. 색은 적갈색이지만, 개체에 따라 짙은 것과 얕은 것이 있다. 빛에 따라 반사되어 청남색으로 보이기도 한다. 등은 무지개빛 광채가 있고, 곳곳에 노란색 가시털이 있다. 배는 적갈색으로 진주빛 광택이 강하다. 더듬이는 노란색이며 10마디인데 더듬이의 곤봉처럼 생긴 끝부분은 수컷의 것이 첫 마디보다 약간 길고, 암컷은 훨씬 짧다.</p> <p>날개에 9개의 점무늬가 세로로 나 있고 가장자리에는 가시털이 있다. 앞가슴 등쪽의 가장자리와 다리에도 가시털이 나 있으며 뒷다리의 종아리 마디가 넓다.</p> <p>번데기는 얇은 갈색이며 한 쌍의 가시털이 있다. 애벌레의 색은 얕은 황백색이다. 몸의 5~9번째 마디에 가로로 세 줄의 띠가 있고 짧은 털이 뭉쳐서 무더기로 나 있다. 배 끝 아래쪽에 불규칙한 짧은 털이 드문드문 나 있고 그 밑에 가시털이 한 줄 가로로 나 있다.</p> <p>1년에 한 번, 4월 중순~6월 하순에 나타난다. 성충이 되는데 걸리는 시간은 125일이다. 알의 형태로 19일, 애벌레는 91일, 번데기로 15일을 보내고 7월 중순~9월 하순에 성충이 된다.</p> <p>성충은 밤에 나와서 나무의 눈, 잎을 깎아 먹고, 애벌레는 뿌리를 먹는다. 성충의 모습으로 땅 속에서 겨울을 난다.</p>