



: 2026 1 16 10:28



배추흰나비 / *Pieris rapae* (Linnaeus, 1758)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	흰나비속
과국명	흰나비과

과명	Pieridae
일반특징	<p>앞날개 길이는 19~27mm 정도이다. 날개는 대개 흰색 혹은 연한 노란색을 띠는 경우가 많고, 앞날개 끝에는 검은색 무늬가 있다. 이 무늬는 대만흰나비와 구별하는 데 있어 가장 중요한 특징이다.</p> <p>번데기는 회색빛이 도는 노란색이고 머리와 가슴에 돌기가 하나 발달되어 있다. 애벌레는 녹색이며 잔털이 빽빽하게 나 있다. 알은 노란색 원기둥 모양이다.</p> <p>겨자과 작물을 먹는다. 애벌레는 잎맥만 남기고 모두 먹어버리는데, 특히 봄과 가을에 피해가 심하다. 대개 암수 모두 무, 개망초, 사산비장이, 엉겅퀴 등의 꽃에서 꿀을 먹는다. 특히 노란색과 보라색 계통의 꽃을 선호한다.</p> <p>수컷은 축축한 곳에서 물을 먹는 것이 관찰되기도 한다. 암컷은 잎 표면, 뒷면을 가리지 않고 알을 낳는데 농약을 뿌리지 않고 농사 짓는 땅에서 알과 애벌레를 많이 볼 수 있다. 번데기의 모습으로 겨울을 난다.</p>