



버들참빗 / *Diplazium subsinuatum* (Wall. ex Hook. & Grev.) Tagawa

구분	설명
생물분류	식물
속국명	진고사리속
과국명	면마과

과명	Dryopteridaceae
일반특징	<p>요약설명 : 면마과 상록성 다년초로 난대성 양치식물에 속하며 제주도를 비롯하여 진도, 거문도 등의 남부 다도해 지방에 서식한다.</p> <p>분포지역 : 제주도를 비롯하여 진도, 거문도 등의 남부 다도해 지방에 서식한다.</p> <p>형태 : 상록성 다년초이며 난대성 양치식물에 속한다.</p> <p>크기 : 키 4~6m</p> <p>꽃색 : 분홍색</p> <p>개화기 : 5월,6월</p> <p>잎몸은 가늘고 길며 끝이 뾰족한 모양으로 가장자리가 약간 뒤로 젖혀진다. 잎맥은 뚜렷하지 않고 서로 평행을 이룬다. 가죽질의 잎은 관상가치가 높다.</p> <p>포자낭군은 가늘고 길쭉한 선형으로 긴 것과 짧은 것이 있다. 포막은 가장자리가 밋밋하여 2개의 뒷면이 서로 맞닿은 것도 있다.</p> <p>뿌리줄기는 가늘고 옆으로 길게 퍼지며 흑갈색 비늘조각이 달린다.</p>