



별사상자 / *Cnidium monnieri* (L.) Cusson

| 구분   | 설명    |
|------|-------|
| 생물분류 | 식물    |
| 속국명  | 갯사상자속 |
| 과국명  | 산형과   |

|      |   |
|------|---|
| 과명   | Umbelliferae  |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 산형과 두해살이풀로 우리나라, 중국, 몽골, 러시아에 분포하고 주로 북부지방에서 자라지만 남부지방의 산지에서도 자란다.</p> <p>분포지역 : ▶한국, 중국, 몽골, 러시아에 분포한다.▶주로 북부지방에서 자라지만 남부지방의 산지에서도 자란다.</p> <p>형태 : 두해살이풀</p> <p>크기 : 높이가 1m에 이른다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 6월,7월</p> <p>뿌리에서 난 잎과 줄기 밑부분 잎은 잎자루가 짧고 밑이 잎집으로 되며 꽃이 피는 시기에 없어진다. 잎은 어긋나기하며 달걀모양이고 3회 날개깃모양으로 잘게 갈라진다. 잎 가장자리가 뒤로 말려 두꺼워지며 짧고 흰 까락이 달린다. 6~7월에 흰꽃이 겹우산모양꽃차례로 핀다. 꽃차례는 15~30개이다. 7~8월에 열매가 익는다. 열매는 껍질이 쪽으로 갈라지는 분과로 타원형이고 날개같은 흰색 능선이 10개 있다.</p> <p>줄기가 곧추서며 밑부분은 때때로 자줏빛을 띠고 털이 있다. 줄기 윗부분은 털이 없고 속은 비어있고 세로로 능선이 있다.</p> |