



병아리다리 / *Salomonium oblongifolium* DC.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	병아리다리속
과국명	원지과

과명	Polygalaceae
일반특징	<p>요약설명 : 원지과 1년생 초본으로 일본, 대만, 인도, 말레이시아, 호주, 우리나라(전라북도 남원시, 경상남도 산청군, 부산시)에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 일본, 대만, 인도, 말레이시아, 호주 / 한국(전라북도 남원시; 경상남도 산청군; 부산시)</p> <p>형태 : 1년생 초본</p> <p>크기 : 높이 6~30cm</p> <p>꽃색 : 자주색</p> <p>개화기 : 8월, 7월</p> <p>잎은 어긋나기하고 긴 타원형으로 끝이 뾰족하다. 잎 가장자리가 밋밋하지만 윗가장자리에는 가시 같은 털이 약간 있다.</p> <p>꽃은 7~8월에 피며 연한 자주색이고 이삭꽃차례에 달린다.</p> <p>열매는 익으면 껍질이 말라 쪼개지면서 씨앗을 퍼뜨리는 삭과로 납작한 콩팥모양이고 가장자리에 가시같은 털이 있다.</p> <p>원줄기는 곧추 자라고 털이 없다.</p> <p>습지에 난다.</p>