



: 2026 1 17 5:48



병조희풀 / *Clematis heracleifolia* DC.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	으아리속
과국명	미나리아재비과

과명	Ranunculaceae
일반특징	<p>요약설명 : 미나리아재비과 낙엽 활엽 반관목으로 일본과 중국, 만주, 우리나라 백두대간에 분포하며 그 이외 지역에도 드물게 분포한다.</p> <p>분포지역 : 일본과 중국, 만주; 백두대간이지만 그 이외 지역에서도 드물게 분포.</p> <p>형태 : 낙엽 활엽 반관목.</p> <p>크기 : 높이 1m.</p> <p>꽃색 : 붉은색, 보라색</p> <p>개화기 : 9월, 8월</p> <p>잎은 마주나기하며 넓은 달걀모양으로 약간 두껍다. 잎 양면이 모두 거칠고 털이 약간 있으며 보통 3개의 얇은 결각이 생긴다. 뒷면에는 구부러진 털이 있고 주맥이 도드라져 있다.</p> <p>꽃은 잡성으로 7월 초~9월 초에 핀다. 꽃대와 꽃에 흰색 털이 있다. 꽃은 짙은 하늘색으로 끝이 뒤로 말려있으며 아래를 향해 난다.</p> <p>열매는 나무처럼 딱딱한 껍질속에 씨앗이 있는 수과로 달걀모양이고 붉은색 털이 있으며 9월에 성숙한다.</p> <p>줄기 밑부분은 목질이다. 줄기에 세로 능선이 뚜렷하며 흰색털이 빽빽하게 있다.</p> <p>양지나 음지를 모두 좋아하지만 넓은잎나무 밑의 수풀 가장자리나 도로변, 계곡변에서 잘 자란다.</p>