



보춘화 / *Cymbidium goeringii* (Rchb.f.) Rchb.f.

| 구분   | 설명   |
|------|------|
| 생물분류 | 식물   |
| 속국명  | 보춘화속 |

|      |   |
|------|---|
| 과국명  | 난초과   |
| 과명   | Orchidaceae   |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 난초과 상록 다년초로 관화, 관엽식물이며 우리나라 남부와 중남부 해안의 삼림 내에 자생하고 일본, 중국 등지에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 한국, 일본, 중국 등지에 분포한다. 남부와 중남부 해안의 삼림 내에서 자생한다.</p> <p>형태 : 상록 다년초로 관화, 관엽식물이다.</p> <p>크기 : 꽃대의 높이는 10-25cm, 잎은 길이 20-50cm 정도 자란다.</p> <p>꽃색 : 노란색, 녹색</p> <p>개화기 : 4월, 3월</p> <p>잎은 뿌리에서 모여나기하고 길쭉한 모양으로 끝이 뾰족하다. 잎 가장자리에 미세한 톱니가 있으며 뒤로 젖혀져 구부러진다. 진록색 가죽질이며 생육환경 조건에 따라 형태가 다르게 나타난다.</p> <p>꽃은 3~4월에 피고 연한 연두색이다. 입술모양꽃부리는 흰색 바탕에 짙은 붉은 자주색 반점이 있으며 끝이 3개로 갈라진다.</p> <p>열매는 곧게 서며 아래로 갈수록 가늘어진다.</p> <p>줄기가 짧고 뿌리는 국수발 같은 흰 뿌리가 사방으로 뻗는다.</p> |