

## \_어린이 생물도감

: 2026 1 16 7:22



붉은비단그물버섯 / *Suillus pictus* (Peck) A. H. Sm. et Thiers

구분	설명
생물분류	버섯
속국명	비단그물버섯속
과국명	비단그물버섯과

과명	Suillaceae
일반특징	<p>버섯의 자실체는 크게 갓, 주름, 대로 나누어진다. 붉은비단그물버섯의 갓은 반원 모양 또는 원뿔 모양으로 전개된다. 그 조직은 크림색이고 상처를 입으면 적색으로 변하지만, 자루는 가끔 청색으로 변한다.</p> <p>주름의 관공은 내린형이고, 황색에서 황갈색이 된다. 구멍은 크기가 다르며, 사방으로 거미줄처럼 뻗어 나간 모양으로 배열된다. 상처가 나면 적색 또는 갈색으로 변한다.</p> <p>대는 위아래 같은 굽기이고 아래쪽으로 가늘다. 속은 차 있고 턱받이보다 위는 황색이다. 아래는 줄기 위에 우산 모양으로 덮인 부분과 같은 색이며 가늘고 긴 모양으로 덮여 있다.</p> <p>홀로 또는 무리지어 발생하며 가끔 둥글게 줄지어 바퀴 모양으로 돋아나는 현상을 형성한다.</p> <p>분포지역 : 전국</p> <p>발생계절 : 여름~가을</p>