



비늘고사리 / *Dryopteris lacera* (Thunb.) Kuntze

구분	설명
생물분류	식물
속국명	관중속
과국명	면마과

과명	Dryopteridaceae
일반특징	<p>요약설명 : 면마과 쟁반같이 편평한 모양족으로 다년생 초본이며 중부, 남부, 제주도, 울릉도 등지에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 중부, 남부, 제주도, 울릉도 등지에 분포한다.</p> <p>형태 : 반상족 다년생 초본</p> <p>크기 : 높이 40~80cm.</p> <p>꽃색 : 녹색</p> <p>개화기 : 8월, 7월</p> <p>잎과 줄기에 비늘조각이 뽁뽁하게 있다. 비늘조각은 위로 갈수록 작아지면서 가늘고 길며 끝이 뾰족한 모양으로 된다. 잎몸은 긴 타원형이고 2회 날개깃모양으로 갈라지며 표면은 밝은 연두색이고 뒷면은 흰빛이 돈다. 윗부분의 잎의 깃조각 뒷면 전체에 포자낭군이 달린다. 포막이 둥글며 포자낭군이 달렸던 깃조각은 먼저 마른다.</p> <p>짧고 덩어리같은 뿌리줄기에서 잎이 모여나기한다.</p>