



뿔나비 / *Libythea celtis* (Laicharting, 1782)

| 구분 | 설명 |
|------|-------|
| 생물분류 | 곤충 |
| 속국명 | 뿔나비속 |
| 과국명 | 네발나비과 |

| | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과명 | Nymphalidae |
| 일반특징 | <p>암컷이 수컷보다 날개 윗면에 있는 주황색 무늬가 크고, 앞날개와 뒷날개에 작은 점무늬를 가지고 있다. 다만, 때때로 수컷에게서 이 점무늬가 나타날 때도 있다. 또 뒷날개 아랫면의 가운데 선 위에 검은 줄무늬가 돋보인다.</p> <p>7~8월경 한창 더울 때 여름잠을 자고, 가을에 다시 활동하다가 나비의 모습으로 그대로 겨울을 난다.</p> <p>산지의 활엽수가 많은 곳에 서식하며 길가 축축한 장소에서 떼지어 물을 먹고 일광욕을 하는 일이 많다. 여름에는 과일이나 죽은 동물에 모이는 편이지만 겨울을 나기 전, 후에는 꽃에서 꿀을 먹기도 한다.</p> |