



사과속애기잎말이나방 / *Spilonota albicana* (Motschulsky, 1866)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	사과흰애기잎말이나방속
과국명	잎말이나방과

과명	Tortricidae
일반특징	<p>아랫입술수염의 제 2마디의 비늘털이 길게 위 아래로 퍼져 있어서, 제 3마디가 가려져 보이지 않는다. 앞날개는 회색빛을 띤 흰색이고 날개 끝 부분에서 뒷 가장자리 2/3지점의 바깥쪽은 검은빛을 띤 짙은 갈색 내지 어두운 갈색이다. 날개 길이는 12~15mm이다.</p> <p>1년에 두 번 나타나며 애벌레의 모습으로 겨울을 난다. 다음 해 4월 하순부터 새순이 나오면 갹아 먹기 시작하며, 자라면서 잎을 묶어 그 속에서 번데기가 된다. 6~7월에 첫 번째 애벌레와 성충이 나타나며, 이 중에서도 일찍이 나방이 된 것들은 주로 잎을 묶어 갹아 먹는다. 이후 발생하는 성충과 두 번째 시기에 발생하는 애벌레는 열매를 먹는다.</p> <p>국내는 경기도, 국외는 일본, 중국, 러시아에 분포한다. 우리나라에서는 주로 사과를 먹는 것으로 알려져 있다. 사과나무, 야그배나무, 산사나무, 홍가시나무, 뱀나무, 복숭아나무가 먹이 식물이다.</p>