



: 2026 1 18 9:12



산제비나비 / *Papilio maackii* Menetries, 1859

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	호랑나비속
과국명	호랑나비과

과명	Papilionidae
일반특징	<p>크기가 큰 편이지만, 개체에 따라 차이가 있다. 날개 길이는 41~75mm이며 검은색이고, 초록색, 파란색 등의 광택이 나는 비늘 가루가 있다. 제비나비와 비슷하게 생겼지만 몇 가지 차이점이 있다. 산제비나비는 이성에게 자신을 알리는 표시가 더 크고, 뒷날개 윗면에 있는 붉은색의 반달 모양 무늬도 더 크다. 또한 이 나비는 날개 윗면 가장자리에 푸른빛을 띤 초록색 띠가 있고, 앞날개 아랫면에는 하얀 띠가 있으며, 뒷날개 아랫면의 가장자리에도 하얀색 띠가 있다.</p> <p>1년에 두 번, 봄형은 4월~6월, 여름형은 7월~8월에 걸쳐 나타난다. 주로 산지의 계곡에 서식하며 번데기의 모습으로 겨울을 난다. 수컷은 무리지어 계곡이나 화장실 주변 축축한 곳에서 물을 먹는다. 암수 모두 엉겅퀴, 수수꽃다리, 곰취, 참나리 등의 꽃에 모여 꿀을 먹는다. 일반적으로 산길이나 계곡을 따라 나비길을 만드는 일이 많으며, 재빠르게 날아다닌다. 애벌레의 습성과 생김새는 제비나비와 비슷하다.</p>