


_어린이 생물도감

: 2026 1 19 10:13



개벼룩 / *Moehringia lateriflora* (L.) Fenzl

구분	설명
생물분류	식물
속국명	개벼룩속
과국명	석죽과
과명	Caryophyllaceae
일반특징	<p>요약설명 : 석죽과 여려해살이풀로 일본, 중국, 몽골, 러시아, 유럽, 우리나라에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 일본, 중국, 몽골, 러시아, 유럽 / 한국(서울시 도봉구; 경기도 안성시; 강원도 원주시, 양구군 등)</p> <p>형태 : 여려해살이풀</p> <p>크기 : 높이가 10~20cm정도로 자란다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 6월, 7월</p> <p>잎은 어긋나기하며 잎자루가 없다. 잎은 긴 타원형이며 양끝이 둔하다. 잎 양면 및 뒷면 맥위와 가장자리에 잔털이 있다.</p> <p>꽃은 6~7월에 흰색으로 핀다. 잎겨드랑이와 끝에 꽃차례가 달린다. 꽃차례는 잔털이 있으며 1~3개의 꽃이 달린다. 꽃에는 흰색 꽃잎이 5개 있고 긴 거꿀달걀모양이다. 수술은 10개, 암술대는 3개이다.</p> <p>열매는 3개로 갈라지며 그 조각이 다시 2개로 갈라지는데 익으면 껍질이 말라 쪼개지면서 씨앗을 퍼뜨린다.</p> <p>줄기는 가늘고 밑동에서 가지를 친다. 줄기에는 막을 향한 잔털이 있다.</p>