



새머루 / *Vitis flexuosa* Thunb.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	포도속
과국명	포도과

과명	Vitaceae
일반특징	<p>요약설명 : 포도과의 낙엽 활엽 덩굴성으로 인도, 네팔, 라오스, 베트남, 태국, 필리핀, 중국, 일본; 한반도 황해도와 강원도 이남에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 인도, 네팔, 라오스, 베트남, 태국, 필리핀, 중국, 일본; 한반도 황해도와 강원도 이남에 분포.</p> <p>형태 : 낙엽 활엽 덩굴성.</p> <p>크기 : 길이 3m.</p> <p>꽃색 : 녹색</p> <p>개화기 : 6월</p> <p>별이 드는 곳과 그늘진 곳 모두에서 잘 자라며 건조한 곳보다는 비옥한 곳에서 더 잘자란다. 추위에 견디는 성질이 강하고 도시와 바닷가에서도 자란다.</p> <p>가을에 익은 씨를 채취하여 야외에 묻어놨다가 이듬해 봄에 씨를 뿌린다.</p> <p>줄기는 길이 3m이상 자라고 줄기나 일년생가지에 털이 없다.</p> <p>잎은 줄기를 지탱하는 덩굴과 마주나기한다. 달걀형의 원형 또는 삼각상 달걀형이며 점첨두, 절저 또는 심장저이다. 중앙 가장 큰 맥에 갈색 털이 많고, 톱니가 드문드문 있다. 어린나무의 것은 깊이 갈라지기도 한다.</p> <p>꽃은 암수딴꽃이며 연한 황록색으로 5월 말 ~ 6월 중순에 핀다.</p> <p>원뿔모양꽃차례는 잎과 마주나기한다. 꽃대에서 줄기를 지탱하는 덩굴이 발달한다. 꽃받침은 돌려나기하고 꽃잎 윗부분에서 합쳐져서 밑부분이 떨어진다. 수술은 5개이다.</p> <p>열매는 장과로 검은색이며 2~3개 씨가 들어 있고, 10월에 성숙한다.</p>