



새우난초 / *Calanthe discolor* Lindl.

| 구분 | 설명 |
|------|-------|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 새우난초속 |

| | |
|------|---|
| 과국명 | 난초과 |
| 과명 | Orchidaceae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 난초과의 여러해살이풀로 중국 / 한국(충청남도 태안군; 전라남도; 제주도) 에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 중국 / 한국(충청남도 태안군; 전라남도; 제주도)</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 꽃대는 높이 30-50cm</p> <p>꽃색 : 자주색,백색</p> <p>개화기 : 4월,5월</p> <p>산비탈, 숲속 음지의 비옥한 곳에서 자란다. 씨로 또는 포기 나누기로 번식한다. 열대와 아열대 지방에 많고, 전세계에 약 200종, 우리 나라에는 약 3종이 분포한다.</p> <p>뿌리줄기는 지표 위를 옆으로 기는 성질이다. 마디가 많고 옆주 모양이며 수염뿌리가 다수 있다.</p> <p>잎은 이년생으로 첫해에는 2~3개가 다발로 자란다. 다음해에는 옆으로 늘어지고 잎 모양이 거꾸로 된 피침 모양의 긴 타원형이다. 양끝이 좁다. 잎밑이 날카롭고 끝은 뭉툭하거나 날카로우며 세로로 주름져 겹쳐져 있다.</p> <p>꽃은 4~5월에 핀다. 꽃대는 잎 사이에서 나오고 씨방과 더불어 짧은 털이 있다. 꽃잎은 흰색, 연한 자주색 또는 적자색이다.</p> <p>열매는 삭과이고 밑으로 처진다.</p> |