



서양민들레 / *Taraxacum officinale* Weber

구분	설명
생물분류	식물
속국명	민들레속
과국명	국화과

과명	Compositae
일반특징	<p>요약설명 : 국화과의 여러해살이풀로 지리적으로 북미와 아시아 등지에 분포하고 전국의 도시와 도시 근교에 분포한다.</p> <p>분포지역 : ▶지리적으로 북미와 아시아 등지에 분포▶전국의 도시와 도시 근교에 분포한다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 덩굴줄기 길이 1-2m</p> <p>꽃색 : 노란색, 녹색</p> <p>개화기 : 9월, 8월, 7월, 6월, 3월, 4월, 5월</p> <p>잔디밭이나 풀밭에서 흔히 자란다. 식물체에 쓴맛이 있는 흰색 액체가 있고 유럽에서는 잎을 샐러드로 사용하며 뉴질랜드에서는 뿌리를 커피 대용으로 사용한다.</p> <p>뿌리는 깊이 들어간다.</p> <p>잎은 지면에서 사방으로 퍼진다. 잎은 타원형이고 밑부분이 좁으며 양면에 털이 없다. 가장자리가 밑을 향해 깃털 모양으로 갈라지거나 밋밋하다.</p> <p>꽃은 암수 모두 피는 꽃으로서 3~9월에 핀다. 모두 열매를 맺으며 황색이다. 잎이 없는 꽃대 끝에 1개씩 위를 향해 달린다.</p> <p>열매는 수과로 갈색이며 편평한 정사각뿔이다. 짧고 도드라진 부분이 세로로 나열되며 윗부분이 부리처럼 길어진다.</p>