



선녀부전나비 / *Artopoetes pryeri* (Murray, 1873)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	선녀부전나비속
과국명	부전나비과

과명	Lycaenidae
일반특징	<p>앞날개는 연한 파란색이고, 중심을 제외하고 다른 부분은 어두운 색 테두리가 두껍게 나타난다. 수컷은 파란색 부분이 암컷보다 진하고 보라색을 띤다. 또한 하얀 비늘가루가 적거나 거의 없다. 암컷은 수컷보다 크고, 날개 모양이 넓둥글며, 파란색 부분에 회색 비늘가루가 덮여 있다.</p> <p>활엽수 숲이 발달한 계곡이나 나무를 운반하기 위해 만든 도로 주변의 탁 트인 곳에 서식한다. 강원도 산지에는 숫자가 많지만 다른 지역에는 적은 편이다. 1년에 한 번, 강원도는 7월 초~8월 초, 그 외 지역은 5월~6월에 볼 수 있다. 낮에는 활발하지 않지만 저녁이 되면 일정한 장소를 빠르게 날아다닌다. 가끔 쥐똥나무, 쉬땅나무의 꽃에서 꿀을 먹으며, 축축한 땅에는 모이지 않는다. 암컷은 먹이 식물의 새로운 가지가 갈라진 틈에 알을 하나씩 낳는다. 애벌레는 잎 뒷면에서 살다가 번데기로 변한다. 알의 형태로 겨울을 난다.</p>