



섬괴불나무 / *Lonicera insularis* Nakai

구분	설명
생물분류	식물
속국명	인동속
과국명	인동과

과명	Caprifoliaceae
일반특징	<p>요약설명 : 인동과의 낙엽 활엽 관목으로 일본; 울릉도에 분포한다. 분포지역 : 일본; 울릉도. 형태 : 낙엽 활엽 관목. 크기 : 높이 5 ~ 6m. 꽃색 : 백색, 노란색 개화기 : 6월, 5월 잎은 마주나기하며 달걀형, 거꿀달걀형 또는 타원형이다. 첨두 또는 무딘형이며 넓은 예형, 원저 또는 심장저이다. 가장자리가 밋밋하며, 뒷면에 융털이 존재한다. 꽃은 5월 중순~6월에 잎겨드랑이에 달린다. 꽃대는 털이 있으며 2개의 꽃이 달린다. 꽃부리는 흰색에서 노란색으로 변한다. 열매는 장과로 서로 떨어져 있으며 등글다. 붉은색이며 7~8월에 성숙한다. 줄기는 올라와 우산모양을 이루고 일년생가지에는 융털이 있으며 속은 비어 있다. 가을에 성숙한 열매를 채취하여 과육을 제거하고 야외에 묻어서 저장하였다가 이듬해 봄에 씨를 뿌려 번식시킨다. 보습과 배수가 양호한 모래 진흙에 비옥하고 적당한 습기를 지닌 토양에서 재배하면 잘 자란다. 햇볕이 잘 드는 곳에서 재배하며 약간 그늘이 지는 곳에도 적응이 가능하다. 성질이 강건하여 중부지방에서도 잘 자란다. 백색의 꽃이 황색으로 지는 모습은 우아하고 여름철에 무르익는 열매 또한 아름답다.</p>