



: 2026 1 17 11:16



섬괴불나무 / *Lonicera insularis* Nakai

구분	설명
생물분류	식물
속국명	인동속
과국명	인동과

과명	Caprifoliaceae
일반특징	<p>요약설명 : 인동과의 낙엽 활엽 관목으로 일본; 울릉도에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 일본; 울릉도.</p> <p>형태 : 낙엽 활엽 관목.</p> <p>크기 : 높이 5 ~ 6m.</p> <p>꽃색 : 백색, 노란색</p> <p>개화기 : 6월, 5월</p> <p>잎은 마주나기하며 달걀형, 거꿀달걀형 또는 타원형이다. 첨두 또는 무단형이며 넓은 예형, 원저 또는 심장저이다. 가장자리가 밋밋하며, 뒷면에 융털이 존재한다.</p> <p>꽃은 5월 중순~6월에 잎겨드랑이에 달린다. 꽃대는 털이 있으며 2개의 꽃이 달린다. 꽃부리는 흰색에서 노란색으로 변한다.</p> <p>열매는 장과로 서로 떨어져 있으며 둥글다. 붉은색이며 7~8월에 성숙한다.</p> <p>줄기는 올라와 우산모양을 이루고 일년생가지에는 융털이 있으며 속은 비어 있다.</p> <p>가을에 성숙한 열매를 채취하여 과육을 제거하고 야외에 묻어서 저장하였다가 이듬해 봄에 씨를 뿌려 번식시킨다.</p> <p>보습과 배수가 양호한 모래 진흙에 비옥하고 적당한 습기를 지닌 토양에서 재배하면 잘 자란다. 햇볕이 잘 드는 곳에서 재배하며 약간 그늘이 있는 곳에도 적응이 가능하다. 성질이 강건하여 중부지방에서도 잘 자란다.</p> <p>백색의 꽃이 황색으로 지는 모습은 우아하고 여름철에 무르익는 열매 또한 아름답다.</p>