



: 2026 1 18 1:00



섬매발톱나무 / *Berberis amurensis* var. *quelpaertensis* (Nakai) Nakai

| 구분   | 설명    |
|------|-------|
| 생물분류 | 식물    |
| 속국명  | 매자나무속 |

|      |   |
|------|---|
| 과국명  | 매자나무과   |
| 과명   | Berberidaceae   |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 매자나무과의 낙엽활엽성 관목으로 한국(제주도)에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 한국(제주도)</p> <p>형태 : 낙엽활엽성 관목, 수형·반구형.</p> <p>크기 : 높이 2m 내외.</p> <p>꽃색 : 주황색</p> <p>개화기 : 7월, 6월</p> <p>잎은 새 가지에서는 어긋나기하고 짧은 가지에서는 모여나기한 것처럼 보인다. 거꿀피침모양이고 둔두 또는 예두며 밑모양이 좁아지면서 뾰족한 형태이다. 예리하고 털 모양의 톱니가 있다. 뒷면은 주름이 많고 연한 녹색이다.</p> <p>꽃은 5월에 피고 황색이다. 총상꽃차례는 반쯤 처지고 10~20개의 꽃이 달린다. 꽃잎은 약간 미요두이다.</p> <p>열매는 장과로 긴타원모양이며 9월에 붉게 익는다.</p> <p>줄기는 높이가 2m에 달한다. 반그늘에서 잘 적응하며 재배가 용이하다.</p> <p>소금기와 공해에 강하지 못하다. 햇빛이 잘 들고, 물빠짐이 좋고 비옥한 토양에서 스스로 자란다.</p> <p>매자나무와 매발톱나무의 중간형이다. 매발톱나무에 비해 가시가 더 크고 잎과 열매가 작으며, 매자나무에 비해 자라는 속도가 느린 편이다.</p> |