



섬버들 / *Salix ishidozana* Nakai

| 구분   | 설명    |
|------|-------|
| 생물분류 | 식물    |
| 속국명  | 버드나무속 |
| 과국명  | 버드나무과 |

|      |  |
|------|--|
| 과명   | Salicaceae   |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 버드나무과의 낙엽활엽관목으로 울릉도에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 울릉도에 분포한다.</p> <p>형태 : 낙엽활엽관목</p> <p>크기 : 높이 1m정도로 자란다.</p> <p>꽃색 : 분홍색</p> <p>개화기 : 4월</p> <p>잎은 타원형, 넓은 타원형 또는 긴 타원형이다. 첨두이며 원저 또는 넓은 밑모양이 좁아지면서 뾰족한 모양이다. 가장자리가 밋밋하거나 희미한 톱니가 있다. 표면은 주맥에 털이 있고 주름살이 있으며 뒷면은 회록색이고 털이 있다. 잎자루는 털이 있는 것과 없는 것이 있다.</p> <p>꽃은 꼬리모양꽃차례며 암수딴그루로서 4월에 핀다. 씨방은 짧은 대가 있으며 털이 있고 암술대는 짧으며 암술머리는 4개이다.</p> <p>열매는 삭과이다. 5월에 흑색으로 성숙한다.</p> <p>줄기는 높이가 1m에 달한다. 일년생가지는 녹갈색이며 처음에 잔털이 있으나 점차 없어진다.</p> <p>울릉도 특산식물이다.</p> |