



: 2026 1 18 10:58



2012년도 식물·관총
표본정보DB 구축사업

PLANTS OF KOREA

Family : 버드나무과
Species : *Salix dependens* Nakai (개수양버들)
Locality : 경북 구미시 동락 공원
Hab. & Note :
잎은 좁은 피침형이고 긴 짚첨두이며 꽃은 4월에 일파 같이 피고 용화수는 길이 2-4cm로서 화축에 털이 있으며 포는 피침형 둔두이고 털이 있다
Collector & No. : 흥미향 037
Collector Date : 2007. 05. 03
Determinant : 2007
Yeungnam University Herbarium(YNUH)

개수양버들 / *Salix dependens* Nakai

구분	설명
생물분류	식물
속국명	버드나무속
과국명	버드나무과
과명	Salicaceae
일반특징	<p>요약설명 : 버드나무과 낙엽활엽교목으로 충남 및 평북에 분포한다. 분포지역 : 충남 및 평북에 분포한다. 형태 : 낙엽활엽교목 크기 : 수고가 20m에 달한다. 꽃색 : 녹색, 자주색 개화기 : 4월 줄기는 가지가 밑으로 길게 처지며 일년생가지는 연두색이다. 잎은 좁고 가늘고 길며 끝이 뾰족한 모양이고 가장자리에 잔톱니가 있다. 잎 뒷면은 흰빛이 돈다. 꽃은 4월에 잎과 같이 핀다. 이삭모양의 꽃은 꽃대축에 털이 있다. 씨방은 긴 타원형으로서 털이 없으며 암술대는 약간 길고 암술머리는 2개이며 꿀샘은 1개이다. 열매는 삭과로 익으면 껍질이 말라 쪼개지면서 씨앗을 퍼뜨리는데 능수버들, 수양버들과 비슷하다. 능수버들과 비슷하지만 씨방과 포끝에 털이 없고 잎 양면에 털이 전혀 없다.</p>