



소나무비늘버섯 / *Hymenochaete tabacina* (Sowerby) Lev.

| 구분 | 설명 |
|------|----------|
| 생물분류 | 버섯 |
| 속국명 | 소나무비늘버섯속 |
| 과국명 | 소나무비늘버섯과 |

| | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과명 | Hymenochaetaceae |
| 일반특징 | <p>발생형태설명 : 때죽나무 부러진 가지, 죽은 붉은병꽃나무, 죽은 개나리자실체형태 : 배착성에서 반전하여 갓을 형성, 원형 반점으로 시작, 합류하여 광범위하게 자람, 갓은 기질에서 1cm 돌출, 수평면에서는 주변부에서 반전하여 좌우로 유착된 울타리형, 수직면에서는 상하로 다수 중첩한 반원형자실체조직 : 탄력있는 혁질, 두께는 1mm 미만자실층 : 표면은 평탄한 구조에 작은 돌기가 산재, 담배색에서 커피색, 동심환구와 희미한 방사구가 나있음, 건조하면 방사상의 균열이 생김</p> <p>분포지역 : 치악산, 내장산</p> <p>발생계절 : 여름, 가을</p> |