



쇠별꽃 / *Stellaria aquatica* (L.) Scop.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	별꽃속
과국명	석죽과

과명	Caryophyllaceae
일반특징	<p>요약설명 : 석죽과의 2년생 또는 여러해살이풀로 북반구의 온대와 아열대, 북아프리카, 그리고 우리나라 전국 각지에 분포한다.</p> <p>분포지역 : ▶북반구의 온대와 아열대, 북아프리카에 분포한다.▶전국 각지에 분포한다.</p> <p>형태 : 2년생 또는 여러해살이풀이다.</p> <p>크기 : 높이 20~50cm 내외이다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 7월,8월</p> <p>잎은 마주나기한다. 밑부분의 것은 긴 잎자루가 있으나 위로 올라갈수록 짧아진다. 심장저의 잎이 줄기를 둘러싸며 예두고 털이 없다. 표면의 잎맥이 속 들어간다.</p> <p>꽃은 5~6월에 잎이 달려 있는 가지 끝의 취산꽃차례에 흰색으로 달린다. 잎겨드랑이에는 1개씩 달린다. 꽃자루는 꽃받침과 더불어 샘털이 있다. 그것은 꽃이 핀 다음 밑으로 굽는다. 꽃받침조각은 5개이며 좁은 달걀모양이고 둔두이다. 꽃잎은 5개이나 기부까지 깊게 갈라지므로 10개인 것 같이 보인다. 꽃받침과 길이가 거의 비슷하다. 수술은 10개, 암술은 1개이다.</p> <p>줄기는 높이 20~50cm이다. 밑부분이 옆으로 자라고 윗부분이 어느정도 곧게선다. 윗부분에는 샘털이 약간 있다.</p> <p>뿌리는 수염모양이다.</p> <p>밭, 들의 다소 습한 곳에 나며, 씨로 번식한다.</p> <p>별꽃에 비해 전체가 대형이고, 암술대가 5개인 것이 특징이다.</p>