



쇠보리 / *Ischaemum crassipes* (Steud.) Thell.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	쇠보리속

과국명	벼과
과명	Gramineae
일반특징	<p>요약설명 : 벼과의 여러해살이풀로 제주도와 황해도, 강원도 이남에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 제주도와 황해도, 강원도 이남에 분포한다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀이다.</p> <p>크기 : 높이는 30~70cm이다.</p> <p>꽃색 : 자주색</p> <p>개화기 : 7월</p> <p>잎은 편평하고 양끝이 좁으며 양면에 털이 없으나 퍼진 털이 있는 것도 있다. 가장가지는 꺾끄러우며, 잎집 가장자리에 털이 있다. 잎혀는 짧으며 막의 형태이고 2개로 갈라진다.</p> <p>꽃은 7월에 피고 꽃차례는 원기둥모양이며 자적색이다. 작은이삭은 1마디에 2개씩 달린다. 그 중 1개는 대가 없고 1개는 대가 있다. 대는 삼각형이고 능선에 털이 있다. 수술은 3개이다. 암술대는 2개이다.</p> <p>줄기는 모여나기하고 전체에 털이 없다. 높이는 30~70cm이고 밑부분의 마디에서 굵어 다소 비스듬하게 자란다. 밑부분에서 많은 가지가 갈라진다. 바닷가의 모래땅이나 산록 이하의 습기가 있는 곳 근처에서 모여나기한다.</p>