



쇠털이슬 / *Circaea cordata* Royle

구분	설명
생물분류	식물
속국명	털이슬속
과국명	바늘꽃과

과명	Onagraceae
일반특징	<p>요약설명 : 바늘꽃과의 여러해살이풀로 전국 각처에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 전국 각처</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 키 40-50cm</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 7월,8월</p> <p>잎은 마주나기하고 난상 심장형 또는 넓은 달걀모양이다. 밑부분이 원저 또는 얇은 심장저이다. 가장자리에 얇은 물결모양의 톱니있고 끝이 뾰족하다.</p> <p>잎자루는 길고 짧은 퍼진 털이 있다.</p> <p>총상꽃차례는 원줄기 끝에 달린다. 샘털이 뽀뽀하고 꽃은 7~8월에 핀다.</p> <p>꽃받침조각은 2개이다. 꽃잎도 2개로 흰색이고 거꿀달걀모양으로 2개로 갈라진다. 수술은 2개이다.</p> <p>열매는 원모양이며 홈이 파지고 갈고리같은 털로 덮여 있다. 열매와 길이가 비슷한 대가 있다.</p> <p>높이 40~50cm이고 가지는 없다. 전체에 긴 털과 짧은 털이 있다.</p> <p>뿌리줄기가 옆으로 길게 뻗는다.</p> <p>산지 수림속의 습한 곳에 난다. 세계에 약 12종, 우리나라에는 4종이 분포한다.</p>