



수리딸기 / *Rubus corchorifolius* L.f.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	산딸기속
과국명	장미과

<p>과명</p>	<p>Rosaceae</p>
<p>일반특징</p>	<p> 요약설명 : 장미과의 낙엽 활엽 관목으로 중국, 대만, 일본, 베트남과 한국 전라남도, 제주도에 분포한다. 분포지역 : 중국, 대만, 일본, 베트남; 전라남도, 제주도에 분포. 형태 : 낙엽 활엽 관목. 크기 : 높이 1m. 꽃색 : 백색 개화기 : 5월, 4월 잎은 어긋나기하며, 달걀꼴 또는 달걀상 피침형이다. 점첨두, 예저 또는 심장저이다. 한 점에서 3개의 주맥이 뻗어나간다. 가장자리에 불규칙한 잔톱니가 있다. 표면은 맥 위에 털이 있고 뒷면은 융털이 뺨뺨하다. 꽃은 곁가지 끝에 1~2개씩 달린다. 흰색이고 아래로 드리워진다. 꽃받침조각은 피침 모양이다. 씨방에 흰색 융털이 뺨뺨하다. 2월~3월에 꽃이 핀다. 꽃잎은 긴 거꿀달걀형으로, 꽃받침보다 길다. 열매는 둥글며, 노란붉은색이다. 씨는 주름있으며 4~6월에 성숙한다. 뿌리에서 싹이 나와 한 곳에 떼를 짓는다., 가시가 있으며 일년생가지에 뺨뺨하게 난 털이 있다. 그늘진 곳에는 약하나 건조함에 강하다. 서울지방에서도 바람이 적은 곳에서는 겨울을 나는 것이 가능하여 덤불을 형성한다. 겨울딸기와는 다르며 양지쪽에 잘 자란다. 양지바른 산기슭이나 황폐한 곳 등에 어떤 구역에서 집단으로 침입하여 자란다. 나무 전체에 가시가 나 있다. </p>