



수수꽃다리 / *Syringa oblata* var. *dilatata* (Nakai) Rehder

구분	설명
생물분류	식물
속국명	수수꽃다리속
과국명	물푸레나무과

과명	Oleaceae
일반특징	<p>요약설명 : 물푸레나무과의 낙엽 활엽 관목으로 황해도, 평안남도 및 함경남도의 석회암 지대에 자란다.</p> <p>분포지역 : 황해도, 평안남도 및 함경남도의 석회암 지대.</p> <p>형태 : 낙엽 활엽 관목.</p> <p>크기 : 높이 2 ~ 3m.</p> <p>꽃색 : 자주색</p> <p>개화기 : 4월,5월</p> <p>잎은 마주나기하며 넓은 달걀형이다. 예두 또는 점첨두며 심장저와 비슷한 모양 또는 절저이다. 톱니와 양면에 털이 없다.</p> <p>꽃은 4월에 피고 연한 자주색이다. 원뿔모양꽃차례로 전년 가지 끝에서 마주난다. 꽃대축에 선상의 돌기가 있다. 작은꽃받침은 4갈래로 갈라지며 길이가 서로 같지 않다.</p> <p>열매는 삭과로 타원형이며 첨두이다. 9~10월에 성숙한다.</p> <p>일년생가지는 털이 없으며 회갈색이다. 껍질눈이 뚜렷하지 않으나 이년 가지에는 둥근 껍질눈이 있다.</p> <p>산기슭 양지(석회암지대)에서 자란다.</p> <p>향기가 있는 것이 특징이다.</p>