



수염이끼 / *Hymenophyllum barbatum* (Bosch) Baker

| 구분 | 설명 |
|------|-------|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 처녀이끼속 |
| 과국명 | 처녀이끼과 |

| | |
|------|--|
| 과명 | Hymenophyllaceae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 처녀이끼과의 상록초본으로 제주도 남쪽 계곡에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 제주도 남쪽 계곡에서 자란다.</p> <p>형태 : 상록초본</p> <p>크기 : 높이 30~50cm이다.</p> <p>꽃색 : 붉은색</p> <p>개화기 : 9월, 8월</p> <p>잎은 드문드문 나온다. 잎자루가 있다. 긴 타원형이며 실같은 비늘조각이 있다. 잎자루는 실같이 가늘고 윗부분에 날개가 있다. 잎몸은 2~3회 깃털 모양으로 깊게 갈라진다. 잎줄기에 좁은 날개가 있다.</p> <p>흫씨주머니무리는 쪽잎 끝에 서로 접근하여 달린다. 포막은 2개로 되며 잔톱니가 있다.</p> <p>줄기는 갈색이 도는 녹색이다.</p> <p>뿌리줄기는 가늘고 옆으로 뻗으며 거의 털이 없고 흑갈색이다.</p> <p>계곡의 그늘지고 습한 바위 겉에 붙어 자란다.</p> |