



: 2026 1 16 7:06



싸리 / *Lespedeza bicolor* Turcz.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	싸리속
과국명	콩과

과명	Leguminosae
일반특징	<p>요약설명 : 콩과의 낙엽 활엽 관목으로 중국, 극동러시아, 일본, 우리나라 전국 분포한다.</p> <p>분포지역 : 중국, 극동러시아, 일본; 전국 분포.</p> <p>형태 : 낙엽 활엽 관목.</p> <p>크기 : 높이 3m.</p> <p>꽃색 : 붉은색, 자주색</p> <p>개화기 : 5월, 6월, 7월, 8월</p> <p>잎은 한 지점에서 3개의 잎이 나오는 겹잎이며 넓은 달걀형이다. 원두 또는 약간 오목형이다. 뒷면에는 비단털이 있다.</p> <p>총상꽃차례는 7~8월에 잎겨드랑이 또는 가지 끝에 달린다. 가지 끝에 원뿔모양꽃차례를 형성한다. 꽃은 붉은 보라색이다.</p> <p>열매는 협과로 넓은 타원형으로 끝이 부리처럼 길고, 비단털이 약간 존재한다. 씨는 콩팥모양이고 갈색 바탕에 짙은 색의 반점이 있다. 10월에 성숙한다.</p> <p>줄기 및 가지는 겨울을 나다가 반 이상은 말라 죽는다. 일년생 가지는 능선이 있고 암갈색이며 털이 있으나 점차 없어진다.</p> <p>양지에서 잘 자라고 추위가 강하며 건조에도 강하다. 공해에도 강하고 뿌리는 질기다.</p>