



아왜나무 / *Viburnum odoratissimum* var. *awabuki*

| 구분 | 설명 |
|------|--------|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 산분꽃나무속 |
| 과국명 | 인동과 |

| | |
|------|--|
| 과명 | Caprifoliaceae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 인동과의 상록 활엽 교목으로 일본, 대만, 필리핀, 제주도에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 일본, 대만, 필리핀; 제주도</p> <p>형태 : 상록 활엽 교목.</p> <p>크기 : 높이 10m.</p> <p>꽃색 : 분홍색, 백색</p> <p>개화기 : 7월, 6월</p> <p>잎은 마주나기한다. 타원형 또는 거꿀피침형이고 무딘 모양이다. 표면에 윤기가 있고 뒷면 맥의 겨드랑이에는 털이 있다. 가장자리에 톱니가 없거나 물결모양의 톱니가 있다. 잎자루는 붉은빛이 돈다. 잎맥은 4~6개 정도이다. 꽃은 6~7월에 백색 또는 연한 홍색으로 핀다. 원뿔모양꽃차례로 2쌍의 잎이 있는 일년생가지 끝에 달린다.</p> <p>열매는 핵과로 거꿀달걀형의 타원형이다. 붉은색에서 검은색으로 익으며 9월에 성숙한다.</p> <p>나무껍질은 흑갈색이며 오래된 가지는 껍질눈이 생긴다. 일년생가지는 붉은빛이 돌고 속은 갈색이다.</p> <p>산기슭의 낮은 곳에서 자란다.</p> |