



: 2026 1 16 5:18



0015711



Flora of Baek-du-san (白頭山)
Violaceae
Viola hondoensis W. Becker & H. Boissieu
Local Name 아욱제비꽃
Ae-uk-jeo-beo-kkot, Yulin, China. 2050m. 연변도연변자치구, 길림성.
국가 생물자원보호법, 악제 3-4종 표본은 차단하였습니다.
송현선, 환경부 고시에서 금강종으로 정한 환산선 도로 주변
Collector, Seung-Hyun Cho, Joo-Hwan Kim, Chang-Kun Lim.
Born-Bi Jin
Collection No. MC291
Coll. Date. 25 May, 2011
Herbarium of Hallym University (HCU)

아욱제비꽃 / *Viola hondoensis* W. Becker & H. Boissieu

구분	설명
생물분류	식물
속국명	제비꽃속
과국명	제비꽃과
과명	Violaceae
일반특징	<p>요약설명 : 제비꽃과의 여러해살이풀로 울릉도 및 북부지방에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 울릉도 및 북부지방</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 높이 약 60~90cm이다.</p> <p>꽃색 : 자주색, 백색</p> <p>개화기 : 5월, 4월</p> <p>잎은 거의 원형이다. 가장자리에 낮은 물결모양의 큰 톱니가 있다.</p> <p>꽃은 4~5월에 피며 연한 자주색 또는 흰색이다. 꽃대는 흔히 털이 있다.</p> <p>꽃받침조각은 끝이 둔하고 가장자리에 털이 있다. 입술모양꽃부리에 자주색 줄이 있다.</p> <p>열매는 삭과로 닫힌꽃에서 주로 생기며 둥글다. 흰색털이 있다.</p> <p>전체에 흰색의 퍼진 털이 있고 꽃이 진 다음 옆으로 뻗는 가지가 자라 그 끝에 새싹이 생긴다.</p> <p>뿌리줄기는 짧으며 마디가 많고 잎이 뿌리에서 모여나기한다.</p> <p>산이나 들의 약간 습한 곳에 난다.</p>