

 어린이 생물도감

: 2026 5 27 10:58



0015711



Flora of Baek-du-san (白頭山)
Violaceae
Viola hondoensis W. Becker & H. Boissieu
Local Name 아욱제비꽃
An-tu-san, Yanbian, Jilin, China. 양도령, 연변조선족자치구, 길림성.
국가생물자원보존을 위해 상세표본으로 처리하였습니다.
충청선, 백두산 교차로에서 공룡촌으로 향하는 현충사 도로 주변
Collector: Seong-Hyun Cho, Joo-Hwan Kim, Chang-Kun Lim,
Bom-Bi Jin
Collection No. MC291
Coll. Date: 25 May, 2011
Herbarium of Hallym University (HURU)

아욱제비꽃 / *Viola hondoensis* W.Becker & H.Boissieu

| 구분 | 설명 |
|------|---|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 제비꽃속 |
| 과국명 | 제비꽃과 |
| 과명 | Violaceae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 제비꽃과의 여러해살이풀로 울릉도 및 북부지방에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 울릉도 및 북부지방</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 높이 약 60~90cm이다.</p> <p>꽃색 : 자주색, 백색</p> <p>개화기 : 5월, 4월</p> <p>잎은 거의 원형이다. 가장자리에 낮은 물결모양의 큰 톱니가 있다.</p> <p>꽃은 4~5월에 피며 연한 자주색 또는 흰색이다. 꽃대는 흔히 털이 있다.</p> <p>꽃받침조각은 끝이 둔하고 가장자리에 털이 있다. 입술모양꽃부리에 자주색 줄이 있다.</p> <p>열매는 삭과로 달힌꽃에서 주로 생기며 둥글다. 흰색털이 있다.</p> <p>전체에 흰색의 퍼진 털이 있고 꽃이 진 다음 옆으로 뻗는 가지가 자라 그 끝에 새싹이 생긴다.</p> <p>뿌리줄기는 짧으며 마디가 많고 잎이 뿌리에서 모여나기한다.</p> <p>산이나 들의 약간 습한 곳에 난다.</p> |