

_어린이 생물도감

: 2026 1 17 11:24



개족도리풀 / *Asarum maculatum* Nakai

구분	설명
생물분류	식물
속국명	족도리풀속
과국명	취방울덩굴과

과명	Aristolochiaceae
일반특징	<p>요약설명 : 쥐방울덩굴과 여러해살이풀로 우리나라 전라남도, 제주도에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 한국(전라남도; 제주도)</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 높이 15~30cm이다.</p> <p>꽃색 : 검정색, 자주색</p> <p>개화기 : 5월, 6월</p> <p>낙엽수 하부의 반그늘지고 습한 곳에서 주로 산다.</p> <p>뿌리줄기는 비스듬히 서며 흰색 뿌리가 퍼지고 위끝에 넓은 달걀모양의 붉은갈색 비늘조각이 1~3개 붙어 있다. 마디가 많고 수염뿌리가 많다.</p> <p>잎은 짧은 줄기끝에 1~2장씩 붙으며 텔이 없고 손바닥 모양, 콩팥모양으로 심장저이다. 잎의 표면은 짙은 녹색이며 흰색 무늬가 있다. 잎 가장자리가 빛밋하며 뒷면에 텔이 약간 있는 것도 있다.</p> <p>꽃은 5~6월에 검은빛을 띤 자주색 꽃이 피는데 끝이 3개로 갈라지고 항아리 모양이다. 꽃이 짧은줄기 끝에 수그러져서 피고 꽃 속에 텔은 없으나 능선이 있다. 씨앗은 반타원형이다.</p>