



: 2026 1 19 2:16



알며느리밥풀 / *Melampyrum roseum* var. *ovalifolium* Nakai ex Beauverd

구분	설명
생물분류	식물
속국명	꽃며느리밥풀속
과국명	현삼과

과명	Scrophulariaceae
일반특징	<p>요약설명 : 현삼과의 반기생 1년초로 중부 이남과 동쪽 해안을 따라 함경도까지 분포되어 있다.</p> <p>분포지역 : 중부 이남과 동쪽 해안을 따라 함경도까지 분포되어 있다.</p> <p>형태 : 반기생 1년초.</p> <p>크기 : 높이 30~70cm이다.</p> <p>꽃색 : 자주색, 백색, 붉은색</p> <p>개화기 : 9월, 8월</p> <p>중앙부의 잎은 달걀모양 또는 좁은 달걀모양이다. 길게 뾰족해지거나 갑자기 뾰족해진다. 밑부분이 둥글며 갑자기 좁아져서 밑으로 흐른다. 잎자루는 골이 파진다. 잎몸과 더불어 짧은 털이 다소 흩어져 난다.</p> <p>꽃은 8~9월에 피고 흥자색 또는 흰색이다. 꽃은 줄기에 끝에 나는 총상꽃차례에 달린다. 꽂받침은 잔털이 다소 있다. 쪽잎은 피침형이고 까락같은 끝으로 되어있다.</p> <p>열매는 삭과로 달걀모양이고 끝이 뾰족하며 짧은 털이 있다.</p> <p>줄기는 높이 30~70cm로 능선을 따라 굽은 흰색 털이 있다. 가지가 퍼져서 위를 향한다.</p> <p>꽃며느리밥풀보다 잎이 둥글고 포에 가시톱니가 한층 더 발달한 것이 특징이다.</p>