



암검은표범나비 / *Damora sagana* (Doubleday, [1847])

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	은점표범나비속
과국명	네발나비과

과명	Nymphalidae
일반특징	<p>수컷은 은줄표범나비나 큰흰줄표범나비와 비슷하지만 앞날개 윗면 가운데에 있는 2개의 검은 줄무늬가 하나의 무늬처럼 가깝게 붙어 있고, 그 바깥쪽의 검은 줄이 앞 가장자리 쪽으로 비스듬히 기울어져 있는 것이 차이점이다.</p> <p>수컷은 다른 표범나비류와 같은 무늬와 색을 하고 있지만, 암컷은 푸른 빛이 도는 흑갈색 바탕에 흰 무늬와 띠가 있어 구별하기 쉽다.</p> <p>9월에 여름잠이 끝난 암컷은 메밀꽃에서 꿀을 먹으며, 제비꽃이 있는 그늘진 숲 속의 소나무, 상수리나무의 줄기에 알을 한 개씩 낳는다. 남부의 섬 지방에 사는 것들은 크기가 크고, 그 수가 많아지는 경향이 있다. 낮은 산지의 풀이 많고 환 트인 곳에 서식한다. 수컷은 빠르게 날아다니면서 개망초, 산초나무, 엉겅퀴류 등의 꽃에서 꿀을 먹거나 축축한 땅에서 물을 먹는다.</p>